Qualität der Koloskopie

Prof. Dr. med. Benjamin Misselwitz
Klinik für Viszerale Chirurgie und Medizin

5. März 2021

Kolonkarzinom: #2 Krebs für Männer, #3 für Frauen

10-fache Unterschiede zwischen niedrig-Inzidenzregionen und Hoch-Inzidenzregionen...

Trends in der Inzidenz des kolorektalen Karzinoms im Saarland, Deutschland

Inzidenzreduktion
nach 2002
Alter 55-84 Jahre:

Männer: - 17-20%
Frauen: - 20-26%

Kolorektales Karzinom: Ideale Bedingungen für Screening-Untersuchungen

- Der gesamte Dickdarm kann während einer Koloskopie visualisiert werden
- Krebsvorstufen (Adenome), existieren im Dickdarm für eine lange Zeit
- Adenome können während einer Koloskopie entfernt werden → *vermindert Karzinominzidenz*
- Ein frühes Karzinom kann kurativ operiert werden → *senkt zusätzlich die Mortalität*
- Behandlung eines kolorektalen Karzinomes ist sehr teuer, daher ist das Kolonkarzinomscreening hochgradig kosteneffektiv

Kolonkarzinom-Screening mit FOBT

- Fecal occult blood test (FOBT), Guaiac based FOBT (gFOBT)
 - 3 Stuhlproben, Nahrungseinschränkungen, (kein rotes Fleisch, kein Vitamin C für 3 Tage)
 - Fecal immunochemical test (FIT)
 - 1 Stuhlproben, keine Nahrungseinschränkungen
 - Die Tests müssen alle 1-2 Jahre wiederholt werden
- Exzellente Evidenzlage für den gFOBT:
Reduktion der Mortalität um 15-33% in mehreren RCTs
- Wenig „Enthusiasmus“ für den FOBT/ FIT bei Patienten und Ärzten momentan...

Kolonkarzinom- Screening mit Rektosigmoidoskopie

- Visualisierung des Kolons bis zur linken Flexur
- Nur wenig Patientenvorbereitung (2xPCs)
- Exzellenter Evidenz: 4 RCT >510'000 Patienten
- Meta-analysis von 3 RCT: PLCO, NORCCAP, SCORE
115'139 gescreenten Patienten gegenüber 172'789 Kontrollpatienten, 11 Jahre follow-up
 - Inzidenzreduktion: OR 0.79 (0.74 – 0.84)
 - Reduktion der Mortalität: OR 0.73 (0.64 – 0.83)

→ Für Koloskopie-Screening fehlen aktuell randomisierte kontrollierte Studien

Kanton Uri
KantonsSpital Uri

Kanton Glarus
KantonsSpital Glarus

Kolonoskopiestudie:

- Kantone Uri und Glarus
- 22'818 Individuen in der Altersgruppe 50-80 Jahre wurden per Post kontaktiert
- 2'789 Individuals haben sich registriert, 2'731 wurden eingeschlossen (12%)
- Patient hatte die Wahl zwischen Kolonoskopie, jährlichem FOBT und Sigmoidoskopie alle 5 Jahre
- Alle Untersuchungen waren kostenlos für die Patienten
- 75% haben sich für Kolonoskopiescreening entschieden

Glarus - Uri “close cohort”-Studie

Kolonkarzinom-Incidenz

Stadienverteilung

	Screening n=1912	Kontrollen n=20'774
Stage I	8 (72%)	42 (20%)
Stage II	1 (9%) +1	70 (33%)
Stage III	1 (9%)	51 (24%)
Stage IV	1(9%)	50 (24%)

→ OR Incidenz: 0.31 (0.16 – 0.59, p<0.001)

→ OR Mortalität: 0.12 (0.01- 0.93), p<0.04)

Kolonoskopiescreening kann die Inzidenz und Mortalität des Kolonkarzinoms senken - in einer nicht-randomisierten “closed cohort” Studie in Schweizer Bergkantonen.

Mikrosimulationsstudien für Koloskopie Screening

Alter 50-75 Jahre, Intervall 10 Jahre

	CMOST
Reduktion Inzidenz	55%
Reduktion Mortalität	62%
Gerettete Lebensjahre*	178
#Screening Koloskopien*	2,373
#Surveillance Koloskopien*	1,311
#totaler Koloskopien*	3,600
Anzahl verhinderter Kolonkarzinome*	37.1
Anzahl verhinderter Kolonkarzinomtoter*	15.8
#Kolonkopien um ein Kolonkarzinom zu verhindern	78.2
#Kolonoskopie pro gerettetes Lebensjahr	16.3

* pro 1,000 Individuen

Van Ballegooijen et al., Med. Decis Making 2011; 31:540

Prakash et al., BMC Medical Informatics and Decision Making 2017; 17:80

Deibel et al., GIE 2021 in press

Qualität der Koloskopie

Bessere Qualität der Koloskopie

- mehr Karzinome werden früh entdeckt
- mehr Polypen werden früh entdeckt → Karzinome werden verhindert
- Weniger Intervallkarzinome treten auf

Intervallkarzinom: Karzinom das vor der nächsten geplanten Koloskopie auftritt (Screening oder Surveillynce)

→ *Was ist die beste Definition für die Qualität der Koloskopie*

Boston Bowel Preparation Scale

BBPS		3	2	1	0
3=Excellent					
2=Good					
1=Poor					
0=Inadequate					
Linkes Kolon	☐				
Transversum	☐				
Rechtes Kolon	☐				
BBPS= ☐					

Adäquat: «Adenome > 5 mm können erkannt werden.»

Starke Effekte für Detektion früher Adenome

Nur moderate Effekte für Detektion fortgeschrittener Adenome (ca. 25% Reduktion inadäquat vs. Adäquat)

Adenoma detection rate (ADR)

- Intervallkarzinom: vor geplanter Surveillance
- Adenoma Detektionsrate (ADR):
 - Prozentsatz von Koloskopien mit ≥ 1 Adenom

Adenoma detection rate (ADR)

- Retrospektive Studie 45,026 Patienten, 186 Endoskopiker
- Intervallkarzinom: Karzinom <5 Jahre nach Screeningkoloskopie oder vor geplanter Surveillance
- Im Durchschnitt: 42/188,788 Personenjahre (0.2 pro 1000 Jahre)

10-fach höheres Risiko
Wenn ADR <20%

Adenoma detection rate (ADR)

- Retrospektive Studie 314,827 Patienten, 136 Endoskopiker
- 712 Intervallkarzinome, 255 fortgeschrittene Karzinome, 147 Todesfälle
- Risiko von Intervallkarzinom hängt von ADR ab:
 - ADR 7.4%-19% 0.98 pro 1000 Personen-Jahre
 - ADR 19.1%-23.9% 0.86 pro 1000 Personen-Jahre
 - ADR 23.8-28.4% 0.8 pro 1000 Personen-Jahre
 - ADR 28.4%-33.5% 0.7 pro 1000 Personen-Jahre
 - ADR 33.5%-52.5% 0.48 pro 1000 Personen-Jahre

Oberste vs. unterste Quintile ca. 2-fach erhöhtes Risiko
Jedes 1% höhere ADR: 3% weniger Intervallkarzinome

Adenoma detection rate

- Ziel: $\geq 20\%$ Frauen, $\geq 30\%$ Männer
- Kritik: wenig resistance to «gaming»
«behaviour directed towards meeting the target...
but not improving quality»
 - «one and done approach»
 - Labeling als «Screening» nur wenn Polypen gefunden
- Sagt nichts über eine einzige Koloskopie aus

Qualitätsindikatoren bei Screening

Prä-Procedure:

- Akzeptierte Indikation $\geq 80\%$
- Informed consent, Risikodiskussion: $\geq 98\%$
- Screening/ Surveillance Intervalle werden eingehalten: $\geq 90\%$

Intra-Procedure:

- Darmvorbereitung dokumentiert: $> 98\%$
- Darmvorbereitung adäquat (Polypen $> 5\text{mm}$ können erkannt werden: $\geq 85\%$
- Zökum intubiert (mit Foto): $\geq 95\%$
- ADR: $\geq 20\%$ Frauen, $\geq 30\%$ Männer
- Rückzugszeit: in $\geq 98\%$ gemessen, Durchschnitt $\geq 6\text{min}$ in negativen Screening Koloskopien

Post-Procedure:

- Perforation $< 1:1000$
- Nachsorgekoloskopie-Empfehlung dokumentiert $\geq 90\%$

Prozentsatz visualisierter Mukosa

- Neuer Qualitätsmarker “% visualisierte Mukosa”
- Durchschnitt visualisierte Mukosa über die gesamte Länge des Kolons...

Vision

Rechtes Kolon

Kolon Transversum

Linkes Kolon

Sichtbarkeit

0%

100%

Studienplan

- Einschluss von >100 (500?) Patienten (mit Einwilligung)
 - Breite Einschlusskriterien (vollständige Koloskopie, intaktes Kolon)
- Aufnahme von Koloskopie (movie) und
- Gleichzeitige Aufnahme des Scopeguides (movie)
 - Spätere Korrelation von Lokalisation und Imagequalität
 - Später Verwenden der internen Scopeguide-Information

- Export von Movie auf Server...
- Manuelles labeln von 10 Movies...
- Training von Bilderkennung (artificial intelligence)
 - Manuelle Korrektur (Verbesserung)
 - Automatische Analyse

Manuelles labeln

- Landmark (terminales Ileum, Appendix)
 - Image-Qualität
 - Lokalisation
- später automatische Image-Analyse
Machine Learning + Image-»Stitching»

Studienfragen

- Korrelation ADR mit %-Mukosa-visualization
- Prädiktoren schlechter visualisierbarkeit
 - Kolonsegment
 - BMI, Position, Buscopan, Rückzugszeit, Geschlecht
- «Lernkurve» für Visualisierungen
 - Hypothese: Erfahrung ermögliche bessere Visualisierung in kürzerer Zeit

Studie: „Qualitätskontrolle bei Dickdarmspiegelung mit Bestimmung der eingesehenen Dickdarmschleimhautfläche“. Study number: _____

1. Aufklärung Patienteninformationen, Einschlusskriterien

1.1 Aufklärung und Einverständniserklärung

Einverständniserklärung unterzeichnet:

Datum |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|

Wenn die Einverständniserklärung nicht unterschrieben wurde, hat dies eine Nichtaufnahme in die Studie zur Folge!

Datum und Unterschrift der Prüfperson: _____

1.2 Allgemeine Patienteninformationen

Teilnehmer/-in Nummer: |_|_|_|

Geburtsjahr: |_|_|_|_|

1.3 Einschlusskriterien (alle müssen erfüllt sein)

	Ja	Nein
1. Freiwillig unterschriebene Einverständniserklärung	☐	☐
2. Fähigkeit die Studieninformation und die Einverständniserklärung zu verstehen	☐	☐
3. Vollständige Koloskopie	☐	☐
4. Alter ≤ 18 Jahre	☐	☐

Patient kann in die Studie eingeschlossen werden: Ja Nein

2. Baseline Informationen und Krankengeschichte

Grund der Koloskopie: _____

Körpergröße: _____ cm	Frühere Koloskopie ☐ Nein ☐ Ja Falls Ja: Datum _____	Frühere Polypen/CRC ☐ Nein ☐ Ja Falls Ja: Datum _____
Körpergewicht: _____ kg BMI _____ kg/m ² (BMI)		

Medizinische Vorgeschichte (frühere Erkrankungen, Operationen)

3. Kolonoskopie

ID des Untersuchers _____ ggf. ID des Supervisors _____

Typ des Koloskops CF PCF

Medikation

Buscopan Nein Ja

Fentanyl Nein Ja

Umlagerung? Nein Ja

Terminales Ileum erreicht? Nein Ja

Zeit des Hochspiegels _____

Loop während des Hochspiegels? Nein Ja

Wenn ja, welche? alpha-loop reverse alpha-loop
 N-loop gamma-loop transverse-loop

Reinigungszustand (BBPS)? _____ Punkte gesamt (max. 9)

Zökum-C. ascendens C. transversum C. descendens-Sigma

Rückzugszeit? _____ Minuten

Rückzug durch Resident Attending

Inversion Zökum Nein Ja

Inversion Rektum Nein Ja

Anzahl und Grösse (in mm) der Polypen

C. ascendens C. transversum C. descendens Sigma Rektum

Histologie der Polypen

Prozentual eingesehene Schleimhautoberfläche (im Vgl. zur Gesamtoberfläche)

C. ascendens C. transversum C. descendens Sigma Rektum

Datum und Unterschrift der Prüfperson: _____

- Ich bin mir bewusst, dass die in der Teilnehmerinformation genannten Pflichten einzuhalten sind. Im Interesse meiner Gesundheit kann mich der Prüfarzt jederzeit von der Studie ausschliessen.

Ort, Datum	Unterschrift Teilnehmerin/Teilnehmer
------------	--------------------------------------

Bestätigung des Prüfarztes/der Prüfperson: Hiermit bestätige ich, dass ich dieser Teilnehmerin/ diesem Teilnehmer Wesen, Bedeutung und Tragweite der Studie erläutert habe. Es wurde erklärt, dass die Einwilligung für diese Teilnehmerin / diesen Teilnehmer gilt. Ich versichere, alle im Zusammenhang mit dieser Studie stehenden Verpflichtungen gemäss des geltenden Rechts zu erfüllen. Sollte ich zu irgendeinem Zeitpunkt während der Durchführung der Studie von Aspekten erfahren, welche die Bereitschaft der Teilnehmerin/ des Teilnehmers zur Teilnahme an der Studie beeinflussen könnten, werde ich sie/ ihn umgehend darüber informieren.

Ort, Datum	Name und Vorname der Prüfarztin/ des Prüfarztes in Druckbuchstaben
	Unterschrift der Prüfarztin/des Prüfarztes

Studienteam

- Thrassos Gkrezios
- Andrew Macpherson
- Nastasia Pitsis (Masterstudentin)
- Prof. Kuangyu Shi

→ Deep learning, artificial intelligence

<http://www.nukmed.insel.ch/de/lehre-und-forschung/research/artificial-intelligence-and-translational-theranostics/>